



## 腦部放射治療可能發生之併發症

放射治療可能引起程度輕重不等的副作用。由於患者的年齡，患部的位置，放射治療的範圍及劑量，所接受的手術程度，是否合併其他治療等不同因素，發生副作用的機率及程度會因人而有不同的程度。

### A. 急性副作用：

照射治療期間可能會發生噁心、嘔吐及食慾不振，放射治療有時會影響食慾，發生程度因人而異，一般處理方法可以少量多餐，變換食品種類及嚐試新的烹調方法及食用新鮮食物，必要時可依醫師指示用藥。

倦怠感部份原因是放射治療會使身體耗費許多能量來修復，治療時精神壓力大都會引起疲倦。疲倦感有時會在治療數次後消失，有時需等到停止治療後才會慢慢解除。故需多休息及增加營養補充。

因放射線或腫瘤有時可能會造成短暫性腦水腫，醫師會視情況開立類固醇使用。照射範圍內的頭髮於照射約二週後會開始掉落，劑量越大掉落越多，有時也會有皮膚發炎、偶有潰瘍等症狀，停止治療數星期至數個月後大多會恢復。

若耳部在治療範圍附近，有可能產生外耳炎、中耳炎需由醫師處理。此外接受全腦及脊髓照射，有可能發生血球數不足的情形。若治療中發生病情變化情形，請隨時告知診治醫師

### B. 長期副作用有：

可能會發生的有記憶力降低，少數患者會發生賀爾蒙分泌異常，聽力、視力減退，中樞或脊椎神經系統之各種病變，或是局部放射性組織壞死的情形。腦部治療可能引起之後遺症，醫師會於治療前與病人仔細討論。

慈濟醫院台北分院放射腫瘤科

與您一起守護生命、守護健康、守護愛

聯絡電話(02)6628-9779 轉 8851 或 8852