

藥物過敏 怎麼辦

李奶奶因為感冒發高燒到醫院就醫，經醫師注射一劑退燒藥，然後便帶數種感冒治療藥回家休養，回家不久後李奶奶身上竟然出現片狀、紅腫而且奇癢的疹塊，家人趕緊將李奶奶送醫急診。經過醫師的檢查，原來李奶奶是因為對退燒藥藥物過敏。

免疫系統是身體的防禦網，當遇到外來不同於本身的物質，基於保護身體的功能，免疫系統會有一連串複雜的生化反應，目的是要排除這些外來物質，然而在這個過程中，身體有可能出現某些異於平常的症狀，像是皮膚紅疹、搔癢、腫脹、流鼻水、呼吸困難等，這就是所謂的過敏症狀。如果過敏症狀發生的時間點是在服用藥物之後，就可能是藥物過敏。

藥物過敏不一定是發生在第一次服用藥物之後，有時是發生在藥物投予過一次之後，間隔一段時間，再接觸到同樣的藥物，才會產生過敏症狀。一般來說，任何藥物都有引起過敏的可能性，比較容易引起過敏的藥物像是抗生素、放射線顯影劑、麻醉劑、阿斯匹靈 (aspirin)、非固醇類消炎止痛

劑等。引起藥物過敏的原因可能與年紀、性別、疾病、基因等個體的差異有關，服用藥物之後發生藥物過敏的機率、嚴重度也會隨著個體不同而有所不同。

當發生藥物過敏時，該怎麼辦呢？首要的處置是要先停止繼續服用可能引發過敏的藥物，然後請您攜帶著疑似引發過敏的藥物，立即回診就醫，醫師會針對您的過敏症狀給予症狀治療的藥物，包括類固醇及抗組織胺藥物等。

藥師小叮嚀

身體不舒服看醫師時，您一定會向醫師說明不舒服的症狀，那您有向醫師說是否對藥物過敏嗎？還是您曾有過藥物過敏的經驗，那您有記下過敏藥物的名稱嗎？善用藥物紀錄卡，便可讓醫療人員知道您目前正在服藥的藥品或是曾過敏的藥品，進而避免給予可能引發過敏的藥品，以確保您的用藥安全！